


LA NEOSPOROSE

Une maladie due au parasite *neospora caninum*.
Chez le bovin, elle provoque des avortements.

**NI TRAITEMENT,
NI VACCIN.**

Seule la réforme des
femelles infectées
durablement est
CONSEILLÉE.

La NEOSPOROSE se transmet
de deux manières :



La gestion du
placenta est
indispensable

Une femelle contaminée de manière horizontale ne contaminera pas systématiquement sa progéniture sauf pendant une période de gestation. Ce mode de transmission est la plupart du temps de courte durée, car le chien arrêterait assez vite d'excréter des oeufs.

Quand rechercher la néosporose ?

LORS D'UN ACHAT

Ce contrôle est à réaliser pour des femelles destinées à la reproduction. Nous vous recommandons d'avertir le vendeur que vous refuserez un bovin positif. Pour cela, utilisez un billet de garantie conventionnelle pour retourner l'animal en cas de résultat positif. Nous prévenons en cas de projet de fusion ou de cession de troupeau.

LORS D'UN AVORTEMENT

Si l'on observe une série d'avortements ou si on a trop d'avortements sur une année (>3% des femelles pleines qui avortent), des recherches complémentaires doivent être réalisées incluant la néosporose.

Pour toutes informations contactez votre GDS