

Autour de l'alimentation lactée

L'objectif de la conduite alimentaire avant le sevrage est le développement de la panse. Ce développement nécessite l'ingestion dès les premiers jours d'aliments solides appétants et très digestibles.

Pendant toute la phase lactée des règles strictes sont à respecter.

Règles Générales

■ L'eau

L'eau est le premier aliment du veau (1 à 3L d'eau par jour pendant la phase d'allaitement). **Il est indispensable à la croissance du veau et au développement de la population microbienne du rumen.**


Critères de l'eau	
Température	8 – 12 °C
Qualité bactériologique	Normes de potabilité humaine
Teneur en Chlore	< 0,1 ppm

Transition colostrum / lait

Vers 4-5 jours d'âge une transition alimentaire doit être réalisée sur une journée vers un lait de mélange de qualité.

■ Règles de distribution

Le veau est très sensible aux variations de température, d'heures de distribution, de quantité, de qualité,...



Le rituel du veau	
Respect des horaires de distribution	Toujours les mêmes, pour une digestion optimale.
Hygiène de préparation et de distribution	Un seau par veau, lavé à l'eau chaude chaque jour, désinfecté une fois par semaine et entreposé retourné, pas empilé (séchage).
Température de distribution	Distribution à température constante (optimum 40°C), contrôlée avec un thermomètre, utilisation d'un réchauffe lait si nécessaire.
Quantités	Respect du plan d'allaitement. Particularités en fonction du type de lait, pas de variations brusques de volume d'un repas à l'autre.

■ Les laits à éviter

Sont à proscrire : Les laits à délai d'attente de traitements antibiotiques, les laits de mammites.

Les laits à cellules sont des laits modifiés parfois difficiles à digérer, ils doivent être réservés au veau de plus d'un mois.

Alimentation Au Lait En Poudre

L'utilisation de lait à base de poudre de lait écrémé (PLE) est à privilégier.

Respecter strictement la notice de reconstitution.

Si ces règles ne sont pas respectées, le lait sera indigeste pour le veau.

La préparation du lait en poudre	
Concentration	Par litre de buvée, utiliser toujours le même contenant pesé au préalable
L'eau	Température de reconstitution : 55 – 60°C ; qualité bactériologique de l'eau
Brassage	Temps suffisant pour un mélange homogène

Alimentation Au Lait Entier

Le lait entier permet une bonne croissance à condition de respecter certaines règles. L'utilisation du lait de mélange (tank) est préférable pour éviter les variations de composition et donc les indigestions. N'hésitez pas à adapter le volume de lait distribué en fonction de la teneur en matières grasses de votre lait.

TB	40g/kg	44g/kg	48g/kg
Volume équivalent	5 litres	4,5 litres	4 litres

Aliments Solides

L'aliment concentré doit être distribué dès 8 jours d'âge en petites quantités renouvelées afin de stimuler la consommation.

Un fourrage grossier de bonne qualité (de préférence paille) doit être accessible au veau pour stimuler la rumination.