

Sanitaire

Bilan des impacts FCO et MHE

Après un dernier trimestre 2024 marqué par l'apparition de la FCO 3 en Sarthe, l'année 2025 a vu une 2^e vague de FCO 3 déferler à partir de juin 2025. Le GDS 72 et le GTV 72 renouvèlent leurs recommandations sur la vaccination.

L'année 2024 a été marquée par l'arrivée de nouvelles maladies dans notre région, toutes vectorielles, telles que la MHE, la FCO sérotype 8 et sérotype 3. Les conséquences sont hétérogènes suivant les exploitations, avec des symptômes divers : des avortements, des problèmes de fécondité, des mort-nés, des veaux chétifs avec ou sans troubles neurologiques...

Malgré une information importante pour motiver les éleveurs à vacciner durant l'hiver, l'effet escompté n'a pas été obtenu, puisque moins de 10% des bovins ont été vaccinés contre la FCO3 au 30 juin 2025 (alors que 17% des élevages sarthois étaient foyers FCO3).

C'est pourquoi, au vu des impacts à court et moyen terme dans les élevages touchés, le GDS et les vétérinaires incitent fortement à vacciner. C'est le seul moyen de prévention dont nous disposons pour contrer ces maladies !

Dans les troupeaux positifs, on observe une augmentation de 43% des avortements, de 10% de la mortalité et une diminution des naissances de 3% sur le cheptel sarthois. La FCO peut également provoquer une stérilité temporaire chez les taureaux. À ce titre, le GDS

rition des foyers FCO et MHE sur la nouvelle campagne vectorielle de 2025 a débuté en juin. A l'échelle nationale, il y a un très faible nombre de foyers MHE sans qu'il n'y ait d'explication scientifique à ce jour. Pour autant, sur les 5 foyers français, 4 sont sarthois.

Concernant la FCO, nous sommes actuellement à 24 foyers de FCO8 en Sarthe et avons été plus fortement impactés par la FCO3, comme en 2024, avec 208 foyers à ce jour. Nous observons une augmentation du nombre de foyers FCO3 chaque semaine, même pendant cette période où on aurait pu s'attendre à des températures qui freinent l'activité vectorielle.


Sur la saison vectorielle 2025, la vaccination contre la FCO 3 reste toutefois faible dans le Grand Ouest au 30 juin 2025 (moins de 10% en Sarthe). À l'inverse, le Nord et l'Est de la France, fortement touchés en 2024, affichaient de bien meilleurs taux de vaccination en 2025, ce qui explique qu'ils aient été peu touchés cette année. Il est important de rappeler que lors d'un passage viral, seuls 50 à 70% des animaux s'infectent et développent des anticorps. Les 30 à 50% restants demeurent sensibles et peuvent être atteints lors de la saison vectorielle suivante.

Les premières évaluations des impacts de la FCO sur les performances des cheptels révèlent des conséquences importantes. Dans les troupeaux positifs, on observe une augmentation de 43% des avortements, de 10% de la mortalité et une diminution des naissances de 3% sur le cheptel sarthois. La FCO peut également provoquer une stérilité temporaire chez les taureaux. À ce titre, le GDS



S. ROUPILLE


Au vu des impacts à court et moyen terme dans les élevages touchés, le GDS et les vétérinaires incitent fortement à vacciner.



et le GTV recommandent de surveiller la monte, de programmer des échographies et, si nécessaire, de faire tester les taureaux afin de vérifier leur fertilité.



La vaccination reste le moyen le plus efficace de lutter contre la FCO et doit être considérée comme un véritable investissement pour le cheptel.

MAGALI MOREAU, DIRECTRICE TECHNIQUE GDS 72



Nouvelle campagne vectorielle en 2025

En Sarthe, le début de l'appa-



VACCINATION FCO

les recommandations conjointes du GDS 72 et du GTV 72

POURQUOI PARLE-T-ON A NOUVEAU DE LA FCO ?

PARCE QUE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE (FCO), NOTAMMENT LES SÉROTYPES 3 ET 8, CIRCLE DE NOUVEAU SUR LE TERRITOIRE NATIONAL.
LES VÉTÉRINAIRES CONSTATENT CETTE ANNÉE DES IMPACTS IMPORTANTS SUR LA REPRODUCTION : AUGMENTATION DES AVORTEMENTS, GESTATIONS ÉCOURTÉES, ET TROUBLES DE SANTÉ CHEZ LES VEAUX NÉS DEPUIS L'ÉTÉ.

LA VACCINATION EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

NON, ELLE N'EST PAS OBLIGATOIRE À CE JOUR.

MAIS LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE LA RECOMMANDE FORTEMENT POUR LES SÉROTYPES 3 ET 8, AU VU DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET DES CONSÉQUENCES OBSERVÉES EN ÉLEVAGE.

QUAND FAUT-IL VACCINER ?

IDÉALEMENT AVANT LA PÉRIODE D'ACTIVITÉ VECTORIELLE, C'EST-À-DIRE AU PRINTEMPS. CELA PERMET UNE PROTECTION EFFICACE DES ANIMAUX AU MOMENT OÙ LES MOUCHERONS (VÉCTEURS DE LA FCO) SONT ACTIFS.

SI CETTE VACCINATION EST RÉALISÉE LONGTEMPS AVANT L'ÉTÉ, UN RAPPEL VACCINAL SERA NÉCESSAIRE.
LA VACCINATION DEVRA SE FAIRE AVANT LA PÉRIODE DE REPRODUCTION, NOTAMMENT DANS LES TROUPEAUX À VÉLAGES GROUPÉS OU POUR LES LOTS DE GÉNISSES.

EST-IL UTILE DE VACCINER EN FIN DE SAISON 2025 ?

OUI. MÊME SI LA VACCINATION INTERVIENT TARDIVEMENT, ELLE RESTE UTILE POUR TROIS RAISONS :

- ELLE PROTÈGE LES 30 À 50 % DE BOVINS QUI NE SÉROCONVERTISSENT PAS NATURELLEMENT DANS UN TROUPEAU DÉJÀ TOUCHE.
- ELLE LIMITÉ LA CIRCULATION DU VIRUS DANS LE TROUPEAU, EN RÉDUISANT LA CONTAMINATION DES ANIMAUX ENCORE NAÏFS.
- ELLE OFFRE UNE PROTECTION EN CAS DE PROLONGATION INHABITUÉE DE L'ACTIVITÉ VECTORIELLE LIÉE À UNE MÉTÉO CLÉMENTE.

ET SI J'AI DÉJÀ VACCINÉ...

IL FAUDRA FAIRE UN RAPPEL CAR LA DURÉE D'IMMUNITÉ DES VACCINS ACTUELLEMENT DISPONIBLES N'EST PAS ENCORE BIEN ÉTABLIE (ENTRE 6/12 MOIS SELON LE SÉROTYP).

UNE VACCINATION PRÉCOCE (À L'AUTOMNE PAR EXEMPLE) DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE PAR UN RAPPEL AVANT LA PÉRIODE À RISQUE SUIVANTE :

- SOIT AVANT LA MISE À L'HERBE,
- SOIT JUSTE AVANT L'ÉTÉ, SELON L'ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE.

QUI VACCINER ?

TOUT LE MONDE.

UNE VACCINATION COLLECTIVE PERMET UNE MEILLEURE IMMUNITÉ GLOBALE.

DE PLUS, UN PASSAGE SUR DES JEUNES ANIMAUX PEUT IMPACTER LEURS FUTURES CARRIÈRES REPRO (CROISSANCE, DÉVELOPPEMENT DE L'APPAREIL REPRODUCTEUR...).

PEUT-ON CHANGER DE VACCIN D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE ?

POUR LE VACCIN FCO 8 : OUI

POUR LE VACCIN FCO 3 : EN CAS DE CHANGEMENT DE SPÉCIALITÉ COMMERCIALE, IL EST PRÉFÉRABLE DE REPRENDRE LE SCHÉMA VACCINAL COMPLET (PRIMO+RAPPEL), FAUTE DE DONNÉES SCIENTIFIQUES SUR LA COMPATIBILITÉ ENTRE VACCINS DIFFÉRENTS.

QUEL VACCIN CHOISIR ?

LES VÉTÉRINAIRES RECOMMANDENT D'UTILISER DES VACCINS DISPOSANT DE BONNES GARANTIES TECHNIQUES.

IL EST SOUHAITABLE QUE PRIMO ET RAPPEL SOIENT ACCHETÉS SIMULTANÉMENT, AFIN D'ÉVITER QU'UNE ÉVENTUELLE RUPTURE DE STOCK NE COMPROMETTE LE RESPECT DU SCHÉMA VACCINAL.

EN RESUME

- LA VACCINATION CONTRE LA FCO SÉROTYPES 3 ET 8 EST FORTEMENT CONSEILLÉE.
- À METTRE EN PLACE AVANT L'ÉTÉ OU AVANT LA REPRODUCTION.
- RAPPEL NÉCESSAIRE EN CAS DE VACCINATION PRÉCOCE OU DE CHANGEMENT DE VACCIN.
- UNE PROTECTION COLLECTIVE QUI CONTRIBUE À LIMITER LA CIRCULATION VIRALE.
- ANTICIPER VOS COMMANDES DE VACCINS (PRIMO+RAPPEL) AUPRÈS DE VOTRE VÉTÉRINAIRE SANITAIRE.

ET LA MHE ?

AU VU DE L'ABSENCE D'EXPLICATION SCIENTIFIQUE À LA VARIATION DE LA CIRCULATION VIRALE EN MHE, NOUS RECOMMANDONS DE MAINTENIR LA VACCINATION MHE POUR LA CAMPAGNE 2025/2026.